INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA:

Fructus Plantator – jest wieloskładnikowym, uniwersalnym nawozem granulowanym, przeznaczonym głównie do nawożenia: warzyw w uprawie polowej (burak ćwikłowy, ziemniak, marchew, pietruszka, seler, pasternak, kapusta biała; czerwona; włoska, sałata, szpinak, pomidor; papryka i inne), upraw owoców miękkich (truskawka, malina, poziomka, porzeczka, agrest, borówka amerykańska, jagoda kamczacka), roślin sadowniczych (w tym: jabłoń, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia, orzech włoski, leszczyna) – w terminach i dawkach adekwatnych do wymagań pokarmowych tych roślin – zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia; użytków zielonych i trawników, innych roślin w uprawie polowej.

Nawóz działa długotrwale i sukcesywnie uwalnia składniki pokarmowe. Jednakowy skład każdej granuli nawozowej powoduje, że rośliny mają łatwy i równomierny dostęp do wszystkich niezbędnych pierwiastków zawartych w nawozie. Nawóz zawiera magnez, który sprzyja pełnemu wykorzystaniu potencjału plonowania i osiągnięciu zamierzonej jakości plonu.

Fructus Plantator jest nawozem o obniżonej zawartości chloru (nośnikiem potasu w nawozie jest siarczan potasu) w związku z czym nawóz ten jest szczególnie polecany pod rośliny, które są wrażliwe na obecność chloru, do których zalicza się duża grupa roślin warzywnych i owocowych.

Fructus Plantator może być stosowany:

- **Przed siewem lub sadzeniem roślin** – nawóz należy wymieszać równomiernie z podłożem lub uprawną warstwą gleby do głębokości około 10-15 cm
- **Pogłównie** – zgodnie z zasadami wysiewu nawozów przyjętymi dla poszczególnych grup roślin

Nawożona roślina	Orientacyjna dawka w kg/ka
Warzywa w uprawie polowej	500 - 1000
Użytki zielone, trawniki	500 - 600
Ziemniaki bez obornika	600 - 700
Buraki bez obornika	600 - 1000
Truskawka – przed założeniem plantacji	600 - 800
Truskawka – na plantacjach owocujących – wczesną wiosną (w okresie ruszenia wegetacji)	350 - 450
Truskawka – na plantacjach owocujących – po zbiorach owoców (do końca sierpnia)	300 - 400
Malina – przed założeniem plantacji	800 - 900
Malina – na plantacjach owocujących	400 - 500
Porzeczka czarna, agrest – przed założeniem plantacji	800 - 1000
Porzeczka czarna, agrest – na plantacjach owocujących	400 - 550
Rośliny sadownicze – przed założeniem plantacji	850 - 1000
Rośliny sadownicze – na plantacjach owocujących	500 - 1000
Drzewa i krzewy owocowe (pozostałe)	500 - 700
Inne rośliny	Zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

W niektórych przypadkach niezbędne może być zastosowanie nawożenia uzupełniającego wybranymi składnikami pokarmowymi.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zaleconych dawek oraz częstotliwości stosowania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń kontaktuj się z firmą FABRYKA ZIELENI lub dystrybutorem firmy FABRYKA ZIELENI.

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII

możliwe stosowanie **zalecany termin stosowania**

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Nawóz luzem oraz w oryginalnych opakowaniach należy przechowywać na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem lub pod przykryciem w przewiewnych suchych pomieszczeniach w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Chronić przed nasłonecznieniem oraz wilgocią. Przechowywać i transportować w temperaturze od -15 °C do +50 °C.





CE

FABRYKA ZIELENI

PLANTATOR
NPK 5-7-10 + MIKRO

NAWÓZ GRANULOWANY

bezpieczny dla roślin

smaczne owoce

obfity plon

Cl ↓ NAWÓZ O NISKIEJ ZAWARTOŚCI CHLORKÓW <1%

PFC 1(C)(I)(a)(ii): wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy NPK (Ca,Mg,S) 5:7:10 (13:5:37) zawierający mikroskładniki pokarmowe

DEKLAROWANA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW, % (m/m):

N	5,0 %	całkowitego azotu
N	5,0 %	azotu w formie amonowej
P_2O_5	7,0 %	całkowitego pięciotlenku fosforu
P_2O_5	5,0 %	rozpuszczalnego w wodzie pięciotlenku fosforu
P_2O_5	6,0 %	pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
K_2O	10,0 %	rozpuszczalnego w wodzie tlenku potasu
CaO	13,0 %	całkowitego tlenku wapnia
CaO	7,0 %	rozpuszczalnego w wodzie tlenku wapnia
MgO	5,0 %	całkowitego tlenku magnezu
SO_3	37,0 %	całkowitego trójtlenku siarki
SO_3	25,0 %	rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki
B	0,01 %	całkowitego boru w postaci kwasu
Cu	0,010 %	całkowitej miedzi w postaci siarczanu
Fe	0,5 %	całkowitego żelaza w postaci siarczanu
Mn	0,10 %	całkowitego manganu w postaci siarczanu
Zn	0,010 %	całkowitego cynku w postaci siarczanu

GRANULOMETRIA: Min. 90 % produktu ma postać granul o wymiarach od 2,0 mm do 6,0 mm.

SKŁADNIKI: superfosfat prosty (pojedynczy)[1], Nr CAS: 8011-76-5; siarczan amonu[1], Nr CAS: 7783-20-2 siarczan amonu[2], Nr CAS: 7783-20-2; siarczan potasu[1], Nr CAS: 7778-80-5; magnezyt[1], Nr CAS: 546-93-0.

[1]CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny
[2]CMC 11: produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nawóz zawiera:
superfosfat pojedynczy, Numer WE 232-379-5, Nr CAS 8011-76-5
siarczan żelaza x 7 H_2O Numer WE 616-510-7, Nr CAS 7782-63-0

RODZAJ ZAGROŻENIA H:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować sięz OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UFI: U8U2-80ER-D006-U103

NR IDENTYFIKACYJNY PRODUKTU: umieszczono na opakowaniu
OKRES PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA: umieszczono na opakowaniu
MASA NETTO: 25 kg